

Rapport de l'observation de
M. Bouinet chirurgien en
chef de l'hôtel-dieu de Clermont

En auvergne. Sur un tampon
introduit dans la matrice pour arrêter
l'hémorragie utérine.
M. L. âgée de 16 ans; d'un

tempérament délicat, Ressentit
les douleurs de l'enfantement; à
la fin du 9^e mois de sa 1^{re} grossesse; Elles
étaient lentes et ne devinrent vives qu'après
plus de 24 heures; Enfin au bout de 30
naquit un enfant vivant et très gros.
Aussitôt le sang coula abondamment; ce qui
fit présumer à M. B. qui était présent,
que le placenta totalement séparé, allait
être chassé; il attendit en vain: cherchant
alors à s'assurer de l'état de la matrice qui
ne put distinguer, il jugea qu'elle était en
inertie; aussitôt, il y introduisit la main,
afin de terminer la délivrance. pour la



1^{re} fois. dit-il, je rencontrai le placenta
adhérent à la partie droite de la matrice
Et détaché par sa partie correspondante au
fond; la portion adhérente était ^{en} déguisée
dans un ^{en}foncement semblable à un châton.

M. B. fit tout ce qu'il pût pour
séparer de la matrice, la portion
adhérente du placenta, et ne réussit point.
L'accouchée paraissait menacée d'une
mort prochaine par l'hémorragie, il
l'arrêta par le moyen d'un tampon,
maintenu par un chirurgien qui, au
bout de 24 heures, s'apercevant par le
cordon, de la détortuation totale du délivre,
ôta le tampon qui fut aussitôt suivi du
placenta, et de quelques caillots et des
écoulements ordinaires.

La fièvre que M. B. semble attribuer
à la frayeur qu'avait eue la malade ne
tarda pas à se manifester, elle devint
inquiétante, mais elle fut dissipée par
un

un traitement méthodique, et 30
l'accouchée jouit aujourd'hui d'une
santé parfaite.

Pour plus de clarté et de précision,
nous détaillerons cette observation par
partie, et nous examinerons:

1^o L'état de la matrice à l'instant ou
l'enfant en sortit 2^o peu de temps après,
3^o Enfin au moment où M. B. fit des efforts
pour séparer la portion adhérente du
délivré.

Il ne paraît pas que l'hémorragie qui a
suivi immédiatement l'enfant, ait été
considérable; puisque M. Bonnet en
attendait patiemment la cessation; mais
cette hémorragie ayant augmenté, il
chercha à s'assurer de l'état de la matrice
qu'il crut en inertie. il y introduisit
la main et distingua que la portion
du placenta correspondante au fond
de ce viscère, était séparée; et que l'autre
était en linte.



Si nous ne nous trompons point, la
matrice était dans deux états contra-
dictoires. Selon M.^r B., elle était en
inertie; selon nous, elle ^{de Kiste} était restituée,
puisque elle ne peut fournir au placenta
qu'en l'atteignant, qu'en faisant des efforts
inutiles sur lui; qu'en le pectonnant; qu'en
le serrant enfin de toutes parts; ce qui forme
La loge, le chaton, le Kiste qui ne peut
jamais avoir lieu lors de l'inertie complète
de la matrice; ou ce qui est le même que
quand elle est revenue sur elle-même.

L'impossibilité de séparer le placenta
prouve notre assertion, ou le peu d'habileté
de M.^r B. à pratiquer cette opération. pour
en être convaincu, il suffit de le lire. O

Pour la 1.^{re} fois dit-il, je rencontrai le cas
décrit par M.^r Leroux, le placenta adhérent
à la partie droite de la matrice et séparé,
par la partie correspondante au fond. om

L'expérience

L'expérience qui lui aurait appris que le ⁵ cas est très ordinaire, l'aurait garanti de la surprise. Du reste nous pensons que l'hémorragie n'a été considérable que parcequ'on n'a point déliuré à propos.

En effet si, à l'instant où M.^{re} B. s'apercevait que le sang se coulait en trop grande quantité, il eût porté la main dans la matrice, il aurait reconnu, ou quelle étoit revenue sur elle même, ou quelle ne l'étoit pas,

si elle étoit revenue sur elle même; ce que nous croyons, il aurait suffi à M.^{re} B. de séparer la portion adhérente du placenta et de la tirer dehors, pour faire cesser la perte; il n'est point de praticien qui n'en soit convaincu.

Si la matrice, au contraire, étoit en inertie, il étoit inutile qu'il cherchât ailleurs ce qu'il devoit sous la main. En réappliquant et en maintenant fortement contre la matrice, la portion séparée du placenta, elle lui aurait servi de tampon, et il



et il eût bien valu celui qu'il a employé.
Durant ce temps, il aurait prescrit et fait
tout ce qui étoit propre, à réveiller le ressort
affaibli de la matrice; ce qu'il parait avoir
négligé. ce viscère se restaurant, M.^{re} B.
aurait peu-à-peu abandonné la portion
maintenue du délivre, et attendu la
séparation spontanée de la portion
adhérente; si cette séparation n'avait point
eu lieu, il l'aurait opérée avec facilité et
sans danger.

quelque ce précepte soit nouveau, ~
nous croyons que c'est ainsi qu'on doit
se comporter, plutôt que d'emprunter ~
ce que la nature nous offre gratuitement.
par cette conduite, j'ai obtenu dans un cas
semblable ^{le plus} succès inespéré.

Nous savons que depuis que M.^{re} Leroux
a publié son ouvrage, des enthousiastes qu'il
a faits ont abusé du tanpon. personne
ne fait peut-être plus de cas de cet ouvrage
^{que nous} qui nous à paru un des meilleurs sur les
accouchemens. Mais cela ne nous empêche
point

point de ranger le tampon dans la
classe qu'il doit. ^{ou} ~~est~~, et de ne croire
qu'à ses avantages réelles. (2)
(a) V. la thèse de M. ^{ou} ~~de~~ ^{facile}.

2^o le tampon ayant été maintenu
durant 24 heures, dit M. B. le chirurgien
qui le maintenait s'apercevant par le
cordon, de la décortication totale du placen-
ta, retira le tampon qui fut aussitôt
suivi du délire et de quelques caillots.

M. B. nous laisse ignorer à quels
^{signes} ~~symptômes~~ son confrère a reconnu par
le cordon, la séparation totale du
placenta; une telle sagacité ne peut
qu'être rare.

3^o quoique tout ait rentré dans l'ordre,
après la délivrance, l'accouchée a eu de
la fièvre qui a inquiété M. B. Et qui
a exigé tous ses soins. il attribua
cette fièvre à la frayeur qu'aurait eue la
malade; il est plus vraisemblable
qu'elle a été occasionnée par le séjour
du délire. Et du tampon. nous

(a) V. la thèse de M. ^{ou} ~~de~~ ^{facile}.



Nous avons été trop souvent l'ennemi
de pareils faits pour douter de ce que nous
avancions.

L^r. M. B. croit justifier l'usage qu'il a
fait du tampon par deux observations
de M. Leroux.

ou ce dernier était lors des faits cités,
jeune praticien, ou M. B. n'a pas
choisi ceux qui pourraient faire plus
d'honneur à cet habile chirurgien.

il est question dans la 1.^{re} observation
d'une sortie spontanée d'un fœtus
d'environ 2 mois, à la suite de quelques
légères douleurs. il fut suivi d'une perte
considérable qui se calma promptement.
Environ 2 heures après, elle augmenta:
des douleurs vives, des tintemens d'oreille
des syncopes l'accompagnaient. M. Leroux
mandé, trouva l'orifice de la matrice
dilaté d'une piece de 2 li. Et sentit
profondément un bord du placenta.
craignant

craignant pour les jours de la Malade,
il introduisit dans le Vagin un tampon
qui, selon lui, suspendit la perte pendant
2 heures, augmenta la vivacité des tran-
chées et excita des épreintes qui l'épaula-
rent. Enfin. la perte qui se renouvel-
la fut si modérée, que l'on ne réintroduisit
point de tampon. Les douleurs persis-
tèrent pendant 24 heures. M. L. ayant
touché la Malade, sentit, une portion
du délivre qui débordait l'orifice: il la
saisit et voulut la tirer. mais elle se
cassa. les douleurs continuèrent encore
environ 2 heures. M. L. ignore si le délivre
a été chassé ou non, mais l'accouchée n'a
eu d'autre accident que des tachies fatigues
pendant quelques jours.

Cette observation ne milite point en
faveur du tampon.

Les douleurs vives que ressentait l'accou-
chée prouvent que la matrice avait
beaucoup d'activité; qu'elle s'est restituée;
et que les Orifices des Vaisseaux utérins ont
été



été fronces' Et que le placenta serré par
les parois de l'utérus, à servi de tampon
lequel est à préférer; de la cessation
de l'hémorragie sans que le tampon de
M. L. y ait contribué. quelle preuve plus
frappante que celle de ce chirurgien qui
dit que le tampon a été chassé plus de 24
heures avant le délivre, sans qu'il y ait eu
d'hémorragie depuis la sortie.

Dans les cas semblables à celui de
M. L. il suffit ordinairement de porter
une main sur l'abdomen, d'abaisser du
côté de la vulve, la matrice dans la
cavité de laquelle on introduit une ou 2
doigts avec lesquels on fait le placenta
que l'on tire à soi, ayant attention de faire
faire à la f.^e de fortes inspirations, pendant
qu'on opère. par ces précautions, on vient
presque toujours à bout de faire l'extraction
du placenta; lorsqu'il est totalement séparé
de la matrice. Si ne l'était pas, il faudrait l'en séparer,
et se comporter comme nous venons de le
dire.

Si l'on réussit point, les injections
à corriger appropriées

appropriées le font ordinairement fortifié^U
ou font cesser la perte.

Par ce dernier moyen, nous avons
depuis peu, M.^{re} Bi et moi, obtenu le succès
le plus complet pour une dame qui étoit
accouchée spontanément depuis 8 jours, d'un
avorton de 2 à 3 mois; le délire étoit resté.
L'accouchée avoit été fort tranquille jusqu'au
même jour, époque à laquelle elle eut une perte
considérable qui la mit dans le plus grand
danger.

Il est inutile de rapporter une infinité
de faits où j'ai réussi sans tantou.

La 2.^e observation de M. L... est
celle d'une dame accouchée à terme, très
aidément; il tenta pendant une heure, de
faire l'extraction du délivre par les moyens
ordinaires; il ne put réussir. La perte
l'inquiétant, il porta la main dans la
matrice dont il sépara le placenta en
partia; le reste le fut spontanément.
L'accouchée tranquille, M. L... s'absenta
un quart



un quart d'heure: De retour auprès d'elle,
il la trouva dans un état de faiblesse
extrême, ayant porté la main dans la
matrice il la vit d'une très grande
quantité de sang; la malade revint à elle;
mais quelques minutes après, son pouls
s'éclipsa et elle tomba en syncope. M. L...
réitéra l'opération qu'il venait
de faire et de même une 3^e fois. alors un
double tampon fut introduit; celui qui
était dans la vagin sortit le lendemain
matin; celui qui était dans la matrice
ne fut chassé que le 5^e jour.

L'accouchée eût divers accidens dont
il ne fait point mention.

quand M. L. aurait fabriqué cette
observation pour décréditer le tampon, il
ne l'aurait pas faite autrement. D'ailleurs
il s'est écarté de la saine pratique. La
malade était très faible; il ne cherche
point à rétablir ses forces; il s'aperçoit
que la matrice est pleine de caillots,
tampon

13
tampon naturel qui devait être respecté,
il lôte, la nature par deux fois, semble lui
reprocher ses torts, en reproduisant d'autres,
tampons; il méprise ses avis, détruit son
ouvrage, et pourquoi? pour substituer un
tampon artificiel à ceux que la nature
avait placés.

Dans des cas semblables il faut de
toute nécessité, laisser les caillots dans la
matrice, la presser légèrement pour
l'empêcher de se dilater davantage; et
fortifier la malade qui, dès qu'elle le fera,
ressentira des douleurs qui annonceront
l'action du viscère: cette action aug-
mentera peu-à-peu, et les caillots le
plus souvent seront chassés, s'ils ne ^{étaient} ~~le~~
point et que les douleurs fussent vives; le
chirurgien portera un ou deux doigts à
l'orifice qu'il débouchera en délayant
les 1.^{ers} caillots; ce qui suffira pour que
les autres soient expulsés plus ou moins
vite.



promptement, & bon que la matrice aura plus
d'énergie ou moins d'énergie.

J'ai eu la satisfaction d'obtenir
plusieurs succès, en tenant cette conduite.

Les observations de M.^r L. qui
prouvent qu'il s'est servi d'un tampon
sans nécessité; ne peuvent étayer celle de
M. B. qui la invite; c'est pourquoi nous
ne croyons pas que l'Académie puisse
faire usage de l'observation dont nous
avons l'honneur de lui rendre compte.

nous imaginons point de voir
nous occuper ici de la crainte qu'a M. B.
de voir attribuer à la fièvre, soit disant, &
periphrase, les accidents qu'il dit dépendre
du déchirement de quelque portion de
la matrice, occasionné par les efforts
faits pour la déviation partielle du
délivre; lorsqu'il y a perte.

non seulement le déchirement de
la matrice n'aura pas lieu, quand la
déviation du délivre sera opérée par une
main

16

main habile ; mais même quand
cela serait, les accidens qui surviendraient,
ne pourraient être attribués à autre
chose, chaque maladie caractérisée par
ses symptômes se, distingue par eux, Et le
praticien ne s'y méprend point.

Nous avons cru inutile de vous
dire davantage sur la fièvre qui peut
affecter les f.^{es} en couche. nous n'avons
point oublié que nous devons vanger
l'honneur attaqué des chirurgiens &
accoucheurs français. cet objet qui n'au-
rait peu être rempli qu'incomplètement dans
un rapport, le sera entièrement dans
un mémoire dont nous aurons l'hon-
neur de faire part à cette compagnie.



18 juil 1783. Laverdat.